

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA

Arizona Department of Corrections
Health Services Bureau

Inmate Wellness Program
HEP 1034S - 01 - Revised 07/08

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA?

La enfermedad inflamatoria pélvica (PID) puede ocurrir cuando una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual que no recibe tratamiento. El área pélvica del cuerpo femenino contiene todos los órganos reproductivos (sexuales). PID resulta cuando la infección crece en partes del área pélvica, específicamente en el útero, trompas de Falopio u ovarios.

PID es una condición muy grave que requiere rápida atención médica y cumplir con las instrucciones de tratamiento. Las posibles consecuencias de tener PID incluyen dolor crónico en la pelvis, riesgo de infertilidad (incapacidad o dificultad para quedar embarazada) y enfermedad grave. Si no se trata, la enfermedad inflamatoria pélvica puede amenazar la vida.

¿QUIÉNES CORREN RIESGO DE CONTRAER PID?

Cualquier mujer puede contraer PID, sin embargo ciertas mujeres corren mayor riesgo. Entre los posibles factores de riesgo se incluyen:

- actividad sexual, especialmente en mujeres de 15 a 24 años de edad
- el haber tenido múltiples compañeros sexuales
- el uso de un dispositivo intrauterino (IUD) como método anticonceptivo
- Infecciones por Chlamydia o gonorrea no tratadas (enfermedades de transmisión sexual)
- Historia previa de PID

SÍNTOMAS Y CONSECUENCIAS

El síntoma más común de PID es dolor en la pelvis. Este dolor puede acompañarse de salida anormal de sangre por la vagina, descarga va-

ginal, fiebre, dolor de espalda o dolor en las relaciones sexuales.

TRATAMIENTO

La enfermedad inflamatoria pélvica se trata con antibióticos. Es **MUY IMPORTANTE** seguir las instrucciones para tomar los medicamentos exactamente según la receta, para que la infección se vaya del todo. Asegúrese de tomar **TO-DOS LOS MEDICAMENTOS** hasta que se terminen, aún cuando los síntomas comiencen a desaparecer. Para asegurarse que la infección se haya ido hará falta hacerle otros exámenes.

PREVENCIÓN

La prevención incluye la toma de precauciones contra el contagio de enfermedades de transmisión sexual después de salir en libertad del Departamento de Correcciones de Arizona, así como actuar rápidamente para limitar la transmisión y gravedad de la enfermedad si ya se ha desarrollado. He aquí algunas de las maneras en que las mujeres pueden reducir el riesgo:

- abstenerse del sexo o limitar el número de compañeros sexuales
- Utilizar métodos anticonceptivos de barreras (condones)
- buscar evaluación médica por cualquier síntoma de infección de contagio sexual que se presente y solicitar regularmente pruebas de enfermedades de transmisión sexual cuando se realiza la prueba de Papanicolaou
- si se realizó un aborto, tome los medicamentos como se lo indicaron. Asegúrese de cumplir las recomendaciones de seguimiento

“Este documento es una traducción del texto original escrito en inglés. Ésta no es una traducción oficial y no compromete a este Estado ni a ninguna subdivisión política de este Estado.”